

Stendes elevators	Mitrums % (max)	Piemaisījumi % (max)	Proteīns % (min)	Lipeklis % (min)	Tilpummasa kg/hl (min)	Krišanas skaitlis (min.)	Dīgušie graudi % (max)	Citu graudu piemaisījumi % (max)
KVIEŠI								
Pārtikai (1. grupa)	23.0	-	14.0	28	77.0	280	1.0	2.0
Pārtikai (2. grupa)	23.0	-	12.5	25	76.0	250	1.0	2.0
Pārtikai (3. grupa)	23.0	-	11.5	22	75.0	240	1.0	2.0
Lopbarībai	23.0	-	-	-	72.0	-	6.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0						
MIEŽI								
Lopbarībai	23.0	-	-	-	62.0	-	6.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0						
RAPSIS								
			Eļļa % (min)					
Biomasai	20.0	-	40.0		-	-	-	-
Bāzes rādītājs %	8.0	2.0	-		-	-	-	-
RUDZI								
			Piemaisījumi (t.sk. "melnie graudi") % (max)		Tilpummasa kg/hl (min)	Krišanas skaitlis (min.)	Dīgušie graudi % (max)	Citu graudu piemaisījumi % (max)
Pārtikai	23.0	-	0.05		71.0	120	1.0	2.0
Lopbarībai	23.0	-	0.1		68.0		1.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0						
AUZAS								
Pārtikai (1. grupa)	23.0	-	-	-	58.0	-	1.0	2.0
Pārtikai (2. grupa)	23.0	-	-	-	52.0	-	1.0	2.0
Lopbarībai	23.0	-	-	-	48.0	-	6.0	10.0
Bāzes rādītājs %	14.0	1.0						

Bojāti, slimi un kaitēkļu inficēti graudi, kā arī graudi ar neatbilstošām smakām, krāsu vai piemaisījumiem netiek pieņemti. Ar fuzariozi, melnplauku inficēti graudi un dzīvi kaitēkļi nav pieļaujami.

Ieskaites svars graudiem, rapsim un pupām tiek aprēķināts, atskaitot no neto svara mitruma un piemaisījuma zudumus (X m.p.), ko aprēķina pēc formulas:
 $X_{m,p} = (100(m_2 \text{ vai } p_2 - m_1 \text{ vai } p_1)) / (100 - m_1 \text{ vai } p_1)$, kur m_2 - faktiskais mitrums, %, m_1 - bāzes mitrums, %, bet p_2 - faktiskie piemaisījumi, p_1 - bāzes piemaisījumi, %.

*Kvalitātes rādītāji un grupu iedalījums var mainīties atkarībā no ražas gada specifikas.