

humistar®



Augu augšanas veicinātājs
K-5%



Sastāvs:

	Saturs%	Tilpums%	g/l
Cita informācija:			
Sastāvu papildina kālija			
oksīds K ₂ O	5,00	5,50	55
Kopējais humīna ekstrakts	15,00	16,50	165
Humīnskābe	12,00	13,20	132
Fulvīnskābe	3,00	3,30	33

Mitrums 79,5%
pH 13,35
Organiskā viela 8,99%

Importētājs un pārdevējs
SIA Baltic Agro
Lielirbes 32a,
Rīga, Latvija
Tālr. 371-67228851
www.balticagro.lv

NETO MASA
20 L (22 Kg)

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

 **tradecorp**
nutri-performance

APRAKSTS

Humistar ir šķidrās mēslošanas līdzeklis, kā sastāvā ir humīnskābes un fulvoskābes. To izsmidzina tieši virs augsnes pilienu veidā vai izsmidzina virs lauka. To var sajaukt ar citiem šķidrājiem mēslošanas līdzekļiem. Pateicoties preparāta ķīmiski saistošam īpašībam, to ir iespējams izmantot papildus mēslošanai.

Humistar ietekme uz augsni:

- Uzlabo augsnes saķeri, viengabalainību, stabilitāti un struktūras kompleksus, nodrošina labāku gaisa maiņu augsnē, augsne labāk aiztur ūdeni.
- Uzlabo slāpekļa (N), fosforā (P) un kālija (K) izmantošanu.
- Palīdz sadalīt nešķīstošus fosforā savienojumus, atbrīvo katjonus, palīdz augiem tos uzņemt.
- Fizikāli ķīmisko īpašību dēļ aktivizē un uzlabo augsnes mikrofloras attīstību.
- Pozitīvi ietekmē sēklu dīgšanas procesu un sakņu sistēmas attīstību.

LIETOŠANA

Mēslošanai caur lapām

Graudaugi, rapsis, kukurūza, cukurbietes, kartupeļi, dārzeņi:

Mēslojot augsni, lai ielabotu organikas sastāvu: 25-50 l/ha ar 400-500 l ūdens, smidzināt tieši uz augsnes. Var jaukt ar šķidrājiem mēslošanas līdzekļiem NPK vai KAS.

Sēklas materiāla kodināšanai: 1,0-2,0 l/1 tonnai sēklas.

Laistot un smidzinot uz augsnes: 0,2-0,5 l/100 m² platībai

Zālāji, dekoratīvie augi, puķes: Laistot vai smidzinot uz augsnes izmanto 1,3% šķīduma koncentrāciju. Smidzināt pavasarī, kad atsākas augšana. Zālājus smidzināt pēc otrās applaušanas.

Gurķi, tomāti, istabas augi: Laistot izmanto 20 ml/10 l ūdens. Atkārtoti mēslojot ik pēc 10 dienām 3-4 reizes sezonā.

Augļu koki, augļu krūmi, zemenes: Laistot-kopējā ieteicamā deva 25-50 l/ha, sadalot to pa mazākām devām 2-5 reizes sezonā. Atkārtoti mēslojot ik pēc 10-14 dienām.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-200 l/ha.

Temperatūra ne zemāka par +5°C

SADERĪBA

Humistar var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. Nejaukt ar minerāļļām, kalcija nitrātu un skābiem produktiem (pH < 6). Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE

Skrata pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Pirms lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju.



Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 0°C un 40°C

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.
Izgatavošanas datums:
Partijas numurs:



8 435146 600449

LV0420020315